

কাজিত ফলাফলের জন্য খামারীর অত্যাবশ্যকীয় পালনীয় কর্তব্যঃ

- ১। খামারীকে ব্রুডিং পিরিয়ডে বাচ্চার প্রতি অধিক যত্নশীল ও সতর্ক থাকতে হবে।
- ২। অল ইন অল আউট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- ৩। ভ্যাকসিনের বিষয়ে অধিক খেয়াল রাখতে হবে।
- ৪। বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৫। বায়ো সিকিউরিটির প্রতি অধিক মনযোগী হতে হবে।
(উদাহরণ সন্মত, জীবাণুনাশক দ্বারা নিয়মিত খামারের
আশেপাশে স্প্রে করতে হবে, প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ
রাখতে হবে।)

পোল্ট্রি ফার্মের বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থাপনা :

- যে কোন ধরনের দর্শনার্থীর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।
- বন্য প্রাণী ও পাখি যাতে ফার্মে প্রবেশ না করতে পারে তা
ব্যবস্থা করা।
- ফার্ম গেটে ফুটবাথের ব্যবস্থা করা।
- ভালভাবে হাত পা ধৌত করে স্প্রে করে ফার্মে ঢুকতে
হবে।
- ফার্মের মৃতমুরগী ডিসপোজাল পিতে পুতে ফেলতে হবে।
- বাহির হতে যানবাহন ফার্মে প্রবেশের পূর্বে ভালভাবে স্প্রে
করতে হবে।

খাদ্য মজুদ প্রণালী :

- ১। স্টোর এলাকায় কীটপতঙ্গ ও ইদুরজাতীয় প্রাণী মুক্ত হতে
হবে।
- ২। বিতরণের ক্ষেত্রে ফিফো (ফাস্ট ইন ফাস্ট আউট) পদ্ধতি
অনুসরণ করতে হবে।

- ৩। গুদামজাতের সময় আগমনের তারিখ, খাদ্যের শ্রেণী
অনুযায়ী সারিবদ্ধ রাখতে হবে। যাতে একটি অন্যটির
সাথে মিশে না যায়।
- ৪। খাদ্যের ব্যাগ কাঠের মাঁচার উপর রাখতে হবে।
- ৫। খাদ্যের ব্যাগের সারি ১ ফুট ব্যবধানে রাখতে হবে যাতে
সহজে বাতাস সঞ্চালন হতে পারে এবং আদ্রতায় খাদ্য
নষ্ট না হয়।
- ৬। খাদ্য নিয়মানুযায়ী গুদামজাত করতে হবে এবং ১৫
দিনের বেশী সংরক্ষণ করা ঠিক হবে না।
- ৭। স্টক বুক নিয়মিত আপডেট রাখতে হবে এবং কি
পরিমাণ বিলি হচ্ছে তা তদারকি করতে হবে।

উৎপাদিত পণ্যসমূহ

- ✱ ক্রাম্বো এক্সেল ব্রয়লার ফিড
- ✱ ক্রামচিক লেয়ার ফিড
- ✱ লেয়ার কনসেন্ট্রেট-৫০%
- ✱ হাউজ ফিড
- ✱ ক্যাটল ফিড
- ✱ মাইশা ফিশ ফিড
- ✱ মাইশা চিংড়ী ফিড
- ✱ একদিনের মুরগীর বাচ্চা
- ✱ ডাক ফিড
- ✱ বাইপ্রো
- ✱ এইচ. পি. এম আর
- ✱ মিটমোর



বিস্তারিত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন।

স্থানীয় মোবাইলঃ



প্রধান কার্যালয় :

এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড
কাদেরীয়া টাওয়ার, (১০ম তলা) জ-২৮/৮-বি, মহাখালী, সি/এ,
ঢাকা-১২১২, Web : www.acigodrejagrovvet.com

কর্পোরেট কার্যালয় :

এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড
এসিআই সেন্টার, ২৪৫, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-
১২০৮, বাংলাদেশ

ফিড মিল

এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড
কামারখান্দ, ভদ্রঘাট, সিরাজগঞ্জ

হ্যাচারী

এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড
নগরহাওলা, জৈনাবাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর

ব্রিডার ফার্ম

এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড
কাজীর হাট এবং ধামোর, পঞ্চগড়

ডিপো অফিস

এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড

- ১। মাদাইয়া, কুমিল্লা (০১৭৩০-০১৪০৭৪)
- ২। জৈনা বাজার, গাজীপুর (০১৭১৩-০৯৩৮৪৪)
- ৩। নরসিংদী (০১৭৫৫-৫৫২১৯৭)
- ৪। বরিশাল (০১৭৩০-৭০৩৭৩৪)
- ৫। যশোর (০১৭৩০-০২৪৩৪১)
- ৬। চট্টগ্রাম (০১৭১৩-২৭৭৪১১)



ক্রাম্বো এক্সেল ব্রয়লার ফিড



সুখম খাবার

সুস্থ মুরগী

দ্রুত হজম

দ্রুত বৃদ্ধি

এসিআই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড

কোম্পানী পরিচিতি:

এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড এ সি আই লিমিটেড বাংলাদেশ এবং গোদরেজ এগ্রোভেট লিমিটেড ইন্ডিয়া এর একটি যৌথ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান। এ সি আই লিমিটেড বাংলাদেশের ঔষধ, প্রসাধনী, কনজুমার, হাউজহোল্ড প্রোডাক্ট, কৃষি ও ভেটেরিনারি প্রোডাক্টের জন্য একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। গোদরেজ এগ্রোভেট ভারতের শতাধিক বছর ঐতিহ্যের বাহক গোদরেজ গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান যা ভারতে ৩৬ বছর যাবত উন্নত মানের পোল্ট্রি ফিড, ফিস ফিড, একদিনের মুরগীর বাচ্চা ও রিয়েল গুডস চিকেন অত্যন্ত সুনামের সাথে বাজারজাত করে আসছে। এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড বিগত ২০০৫ ইং সন থেকে পোল্ট্রি ফিড বাজারজাত করে আসছে।

এ সি আই গোদরেজ এর ব্রয়লার ফিডের বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

- ❑ **ক্রাস্ট্রো এক্সেল ব্রয়লার** বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে দক্ষ কলাকৌশলীদের দ্বারা পরিচালিত সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনে প্রস্তুতকৃত এবং কম্পিউটার দ্বারা মান নিয়ন্ত্রিত পোল্ট্রি ফিড।
- ❑ বিশেষজ্ঞ পুষ্টিবিদের ফর্মুলা অনুযায়ী **ক্রাস্ট্রো এক্সেল ব্রয়লার** ফিডে ক্যালরী, প্রোটিন, চর্বি, আঁশ, লবন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন, প্রিমিক্স মিনারেল ইত্যাদি সঠিক পরিমাণে বিদ্যমান।
- ❑ **ক্রাস্ট্রো এক্সেল ব্রয়লার** ফিড মাইকোটক্সিন ও প্যাথজেনিক ছত্রাক থেকে মুক্ত।
- ❑ **ক্রাস্ট্রো এক্সেল ব্রয়লার** ফিড উন্নতমানের পি পি ওভেন ব্যাগ এ সরবরাহ করা হয়, যা ফিড এর গুণগত মান বজায় রাখে।
- ❑ মোরগ মুরগীর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা ও ব্রয়লারের ওজন বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি মৃত্যুহার কমাতে **ক্রাস্ট্রো এক্সেল ব্রয়লার** ফিডে বিভিন্ন প্রকার টনিক, ভিটামিন ও এডিটিভসমূহ মেশানো হয়।
- ❑ **ক্রাস্ট্রো এক্সেল ব্রয়লার** ফিডে প্রায়োজনীয় কক্সিডিওস্ট্যাট (ফিনিশার ব্যাতিত) মেশানো হয় যা মোরগ মুরগীর কক্সিডিওসিস রোগ প্রতিরোধ নিশ্চিত করে।
- ❑ **ক্রাস্ট্রো এক্সেল ব্রয়লার** ফিড সকল ব্রিডের জন্য উপযোগী।

ক্রাস্ট্রো এক্সেল ব্রয়লার ফিড এর পুষ্টিমান :

নিউট্রিশন / পুষ্টি	প্রি স্টার্টার ব্রয়লার ১-১০দিন	স্টার্টার ব্রয়লার ১১-২১দিন	ফিনিশার ব্রয়লার
ময়শ্চার (সর্বোচ্চ)	১১	১১	১১
ক্রুড প্রোটিন (সর্বোনিম্ন)	২২	২১	১৯.৫
ক্রুড ফাইবার (সর্বোচ্চ)	৫	৫	৫
ক্রুড ফ্যাট (সর্বোনিম্ন)	৩.৫	৪.২	৫.২
লাইসিন (সর্বোনিম্ন)	১.৪	১.৩	১.২
মিথিওনিন (সর্বোনিম্ন)	০.৬	০.৫৫	০.৫
মিথিওনিন+সিসাটিন	১.২	১	১
টিওনিন (সর্বোনিম্ন)	০.৯	০.৮	০.৭
টেপটোফ্যান (সর্বোনিম্ন)	০.২৩	০.২২	০.২১
টিওনিন (সর্বোনিম্ন)	০.৯	০.৮	০.৭
আরজিনাইন	১.৫	১.৩	১.২
ক্যালসিয়াম (সর্বোনিম্ন)	১	১	০.৯
এভেইলএবেল পি (সর্বোনিম্ন)	০.৫	০.৫	০.৪
এনার্জি (সর্বোনিম্ন)	৩২০০	৩৩০০	৩৩৫০

আমরা সরকারি স্বীকৃতি মোতাবেক ব্রয়লার ফিনিশার খাদ্যে কোন কক্সিডিওস্ট্যাট ঔষুধ ব্যবহার করিনা।

ক্রাস্ট্রো এক্সেল ব্রয়লার এর খাদ্য সূচী :

খাদ্যের নাম	খাদ্যের ধরন	পরিমাণ (গ্রাম)	খাদ্য প্রদান সূচী দিন
প্রি-স্টার্টার	ক্রামোল	৪০০-৫০০	০০-১১/১২
স্টার্টার	ক্রামোল	৭০০-৮০০	১৩-২১
স্টার্টার	পিলেট	১৪০০-১৫০০	২২-৩২
ফিনিশার	পিলেট		৩৩ - বিক্রি পর্যন্ত

খাদ্য পরিবর্তন : এফ সি আর

বয়স	মুরগীর ওজন (গ্রাম)	মুরগীর খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম)	এফ সি আর
৭	১৭৭	১৫০	০.৮৪৭
১৪	৪৫৯	৪৬৫	১.০১৩
২১	৮৯১	১০৫৩	১.১৮২
২৮	১৪৩৬	১৯৬৩	১.৩৬৭
৩৫	২০৬৭	৩২১৬	১.৫৫৭

ঘর প্রস্তুত করন :

হুয়াইট ওয়াশঃ চুন-২৫ কেজি, ব্রিচিং-১ কেজি, তুতে-৬০০ গ্রাম, কেরোসিন-১ লিটার এক সাথে মিশিয়ে মেঝেতে প্রলেপ দিতে হবে।

- ★ সমস্ত ময়লা এবং লিটার খুব দ্রুত পরিষ্কার করতে হবে।
- ★ মুরগীর শেডের পর্দা, সিলিং, নেট, দরজা, খাবারপাত্র, পানির পাত্র, হোভার, চিক গার্ডসহ প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে।
- ★ মুরগীর শেডের প্রতিটি কর্ণার এবং মেঝে ভালোভাবে ঘসতে হবে। প্রতি ১০০০ বর্গফুটের জন্য ২.৫ কেজি কস্টিক সোডার গুড়া পানির সাথে মিশিয়ে মেঝেতে কিছুক্ষন রাখতে হবে।
- ★ ব্রডস্পেট্রাম জীবানুনাশক দ্বারা শেডের প্রত্যেকটি সাইড এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র (পর্দা, সিলিং, নেট, দরজা, খাবারপাত্র, পানির পাত্র, হোভার, চিকগার্ড) ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।
- ★ ভালো ফলাফলের জন্য শেডের মেঝে অবশ্যই পাকা করতে হবে। লিটারের উচ্চতা শীতকালে ২.৫ ইঞ্চি এবং গরমকালে ১.৫ ইঞ্চি রাখতে হবে।
- ★ লিটার হিসেবে ধানের তুষ ব্যবহার করা উত্তম।
- ★ হার্ডবোর্ডের চিকগার্ড ব্যবহার করা উত্তম এবং এর উচ্চতা ১৮ ইঞ্চি রাখতে হবে।

সেড নির্মান :

- ★ মুরগীর ঘর অবশ্যই পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা লম্বি ভাবে তৈরী করতে হবে এবং অবাধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ★ সেডের প্রস্থ সর্বোচ্চ ২৫ ফুট এবং দৈর্ঘ্য খামারীর চাহিদা অনুযায়ী করা যাবে।
- ★ দেয়ালের উচ্চতা ৯ফুট এবং ঘরের চালের বর্ধিত অংশ হবে ৩ ফুট।

ব্রুডিং অবস্থায় প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা :

বয়স	ফারেনহাইট	সেলসিয়াস
প্রথম সপ্তাহ	৯৫°	৩৫°
দ্বিতীয় সপ্তাহ	৯০°	৩২°
তৃতীয় সপ্তাহ	৮৫°	২৯°
চতুর্থ সপ্তাহ	৮০°	২৬°
পঞ্চম সপ্তাহ	৭৫°	২৩°

- ❖ **ব্রুডিং সময়:** শীতকালে সাধারণত ২-৩ সপ্তাহ এবং গরম কালে ১-২ সপ্তাহ বৈদ্যুতিক ব্রুডারের সাহায্যে ব্রুডিং করতে হবে।
- ★ বৈদ্যুতিক ব্রুডারের সাহায্যে ব্রুডিং করলে প্রতি বাচ্চার জন্য ২ ওয়াট প্রয়োজন।

ব্রয়লারের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমান :

বয়স	মেঝের (বর্গফুট), শীতকালে	মেঝের জায়গা (বর্গফুট), গরমকালে
১ - ২ দিন	০.২৫	০.৩০
৪ - ৬ দিন	০.৩৫	০.৪০
দ্বিতীয় সপ্তাহ	০.৫০	০.৬০
তৃতীয় সপ্তাহ	০.৮০	০.৮০
চতুর্থ সপ্তাহ	১.০০	১.২০
পঞ্চম সপ্তাহ	১.০০	১.২০

বয়স অনুযায়ী খাবার ও পানির পাত্রের সংখ্যা :

খাবার পাত্র	১ - ১০ দিন বয়সে	প্রতি ৫০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি পাত্র
	১১-৩৫ দিন বয়সে	প্রতি ২৫ টি বাচ্চার জন্য ১ টি পাত্র
পানির পাত্র	১-১০ দিন বয়সে	প্রতি ৫০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি পাত্র
	১১ - ৩৫ দিন বয়সে	প্রতি ২৫ টি বাচ্চার জন্য ১ টি পাত্র

টিকা দান কর্মসূচী : ব্রয়লার

১) ব্রয়লার

বয়স	ভ্যাকসিনের নাম
৩-৫ দিন	আই বি + এন ডি
৯-১০ দিন	গামবোরো
১৬-১৭ দিন	গামবোরো
২২-২৩ দিন	আই বি + এন ডি / এন ডি

ব্রুডিং অবস্থায় প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা:

বয়স	ফারেনহাইট	সেলসিয়াস
প্রথম সপ্তাহ	৯৫°	৩৫°
দ্বিতীয় সপ্তাহ	৯০°	৩২°
তৃতীয় সপ্তাহ	৮৫°	২৯°
চতুর্থ সপ্তাহ	৮০°	২৬°
পঞ্চম সপ্তাহ	৭৫°	২৩°

ব্রুডিং সময়: শীতকালে সাধারণত ২-৩ সপ্তাহ এবং গরম কালে ১-২ সপ্তাহ বৈদ্যুতিক ব্রুডারের সাহায্যে ব্রুডিং করতে হবে।

✱ বৈদ্যুতিক ব্রুডারের সাহায্যে ব্রুডিং করলে প্রতি বাচ্চার জন্য ২ ওয়াট প্রয়োজন।

কাজিত ফলাফলের জন্য খামারীর অত্যাবশ্যকীয় পালণীয় কর্তব্য

- ১। শেডটি অবশ্যই পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি তৈরী করতে হবে।
- ২। খামারীকে ব্রুডিং পিরিয়ডে বাচ্চার প্রতি অধিক যত্নশীল ও সতর্ক থাকতে হবে।
- ৩। অল ইন অল আউট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- ৪। ভ্যাকসিনেশন বিষয়ে অধিক খেয়াল রাখতে হবে।
- ৫। বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৬। বায়ো সিকিউরিটির প্রতি অধিক মনযোগী হতে হবে। (উদাহরণ সন্মুখ, জীবাণুনাশক দ্বারা নিয়মিত আশেপাশে স্প্রে করতে হবে, প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ রাখতে হবে)

পোল্ট্রি ফার্মের বায়োসিকিউরিটি:

- ✱ যেকোন ধরনের দর্শনাধীন প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- ✱ বন্যপাখি ও প্রাণী যাতে ফার্মে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ✱ ফার্মগেটের ফুটবাথে পরিমাণ মত জীবাণুনাশক মিশ্রিত রাখতে হবে।
- ✱ কর্মীগণকে ফার্মে প্রবেশের সময় ভালভাবে হাত, পা ধৌত করে এবং জীবাণুনাশক দ্বারা স্প্রে করে ঢুকতে হবে।
- ✱ ফার্মের বাইরে চারদিকে জীবাণুনাশক দ্বারা রেগুলার স্প্রে করতে হবে। মৃত মুরগী ফার্ম থেকে দূরে ডিসপোজাল পিতে পুতে ফেলতে হবে।
- ✱ বাহির থেকে কোন যানবাহন ফার্মে প্রবেশের পূর্বে ফার্ম গেটে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

খাদ্য মজুদ প্রণালী:

১. স্টোর এলাকা কীটপতঙ্গ ও ইদুরজাতীয় প্রাণী মুক্ত হতে হবে।
২. বিতরণের ক্ষেত্রে ফিফো পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
৩. গুদাম জাতের সময় আগমনের তারিখ, খাদ্যের শ্রেণী অনুযায়ী সারিবদ্ধ রাখতে হবে। যাতে একটি অন্যটির সাথে মিশে না যায়।
৪. খাদ্যের ব্যাগ কাঠের মাচা উপর রাখতে হবে।
৫. খাদ্যের ব্যাগের সারী ১ ফুট ব্যবধানে রাখতে হবে যাতে স্যাঁত স্যাতে ও নষ্ট না হয় এবং সহজে বাতাস সঞ্চালন করতে পারে।
৬. খাদ্য নিয়মানুযায়ী গুদামজাত করতে হবে এবং ১৫ দিনের বেশী সংরক্ষণ করা ঠিক হবে না।
৭. স্টক বুক নিয়মিত আপডেট রাখতে হবে এবং কি পরিমাণ বিলি হচ্ছে তা তদারকি করতে হবে।

টিকা দান কর্মসূচী : লেয়ার

১) লেয়ার

বয়স	দিন / সপ্তাহ
৩-৫ দিন	আই বি + এন ডি
৮-৯ দিন	এন ডি + আইবিডি কিন্ড/আইবিডি (লাইভ)
১০-১১ দিন	আইবিডি (লাইভ)
১৪ দিন	আই বি ভেরিয়েন্ট
১৭-১৮ দিন	আইবিডি (লাইভ)
২২-২৩ দিন	এন ডি / আই বি + এন ডি
৫-৬ সপ্তাহ	ফাউল পক্স
৮ সপ্তাহ	ফাউল কলেরা
৯ সপ্তাহ	করাইজা + সালমোনেলা / করাইজা কিন্ড
১১-১২ সপ্তাহ	চৌট কাটা
১৫ সপ্তাহ	করাইজা + সালমোনেলা / করাইজা কিন্ড
১৬ সপ্তাহ	আই বি ভেরিয়েন্ট + এন ডি লাসোটা
১৬ সপ্তাহ	আই বি + এন ডি + ই ডি এস কিন্ড

- ✱ পিক প্রোডাকশনের সময় এনডি এবং আইবির এন্টি বডি টাইটারের উপর নির্ভর করে প্রতি ৫-৬ সপ্তাহ অন্তর ভ্যাকসিন দিতে হবে।
- ✱ মেটারনাল এন্টি বডির উপর নির্ভর করে দিতে হবে।

বিঃদ্রঃ

- ✱ প্রদত্ত সিডিউলটি এলাকায় রোগের প্রকোপ ও মুরগীর শারিরীক অবস্থার উপর নির্ভর করে পরিবর্তন হতে পারে।
- ✱ সকল ভ্যাকসিনের কুল চেইন মেনে চলতে হবে।
- ✱ হ্যাচারিতে একদিন বয়সে ম্যারেঞ্জ ভ্যাকসিন দেওয়া না থাকলে এক দিন বয়সে ম্যারেঞ্জ ভ্যাকসিন দিতে হবে।

এসিআই গোদরেজ কৃত্রিম উৎপাদিত অন্যান্য পণ্য সমূহ:

- ✱ ক্রমশো এক্সেল ব্রয়লার ফিড
- ✱ ক্রমচিক লেয়ার ফিড
- ✱ লেয়ার কনসেন্ট্রেট-৫০%
- ✱ হাউজ ফিড
- ✱ ডাক ফিড
- ✱ মাইশা ফিশ ফিড
- ✱ মাইশা চিংড়ী ফিড
- ✱ একদিনের মুরগীর বাচ্চা
- ✱ ক্যাটল ফিড

বিস্তারিত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন।

স্থানীয় মোবাইলঃ



প্রধান কার্যালয় :

এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড
কাদেরীয়া টাওয়ার, (১০ম তলা) জ-২৮/৮-বি, মহাখালী, সি/এ,
ঢাকা-১২১২, Web : www.acigodrejagrovet.com

কর্পোরেট কার্যালয় :

এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড
এসিআই সেন্টার, ২৪৫, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-
১২০৮, বাংলাদেশ

ফিড মিল

এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড
কামারখান্দ, ভদ্রঘাট, সিরাজগঞ্জ

হ্যাচারী

এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড
নগরহাওলা, জৈনাবাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর

ব্রিডার ফার্ম

এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড
কাজীর হাট এবং ধামোর, পঞ্চগড়

ডিপো অফিস

- এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড
- ১। মাদাইয়া, কুমিল্লা (০১৭৩০-০১৪০৭৪)
 - ২। জৈনা বাজার, গাজীপুর (০১৭১৩-০৯৩৮৪৪)
 - ৩। নরসিংদী (০১৭৫৫-৫৫২১৯৭)
 - ৪। বরিশাল (০১৭৩০-৭০৩৭৩৪)
 - ৫। যশোর (০১৭৩০-০২৪৩৪১)
 - ৬। চট্টগ্রাম (০১৭১৩-২৭৭৪১১)



ক্রমচিক এক্সেল লেয়ার ফিড

অধিক লাভ

সুস্থ মুরগী

সুখম খাবার

বেশি ডিম

এসিআই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড

কোম্পানী পরিচিতি:

এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড এ সি আই লিমিটেড বাংলাদেশ এবং গোদরেজ এগ্রোভেট লিমিটেড ইন্ডিয়া এর একটি যৌথ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান। এ সি আই লিমিটেড বাংলাদেশের ঔষধ, প্রসাধনী, কনজুমার, হাউজহোল্ড প্রোডাক্ট, কৃষি ও ভেটেরিনারি প্রোডাক্টের জন্য একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। গোদরেজ এগ্রোভেট ভারতের শতাধিক বছর ঐতিহ্যের বাহক গোদরেজ গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান যা ভারতে ৩৬ বছর যাবত উন্নত মানের পোল্ট্রি ফিড, ফিস ফিড, একদিনের মুরগীর বাচ্চা ও রিয়েল গুডস চিকেন অত্যন্ত সুনামের সাথে বাজারজাত করে আসছে। এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড বিগত ২০০৫ ইং সন থেকে পোল্ট্রি ফিড বাজারজাত করে আসছে।

এ সি আই গোদরেজ এর লেয়ার ফিডের বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- ❑ ক্রামচিক এক্সেল লেয়ার ফিড বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে দক্ষ কলাকৌশলীদের দ্বারা পরিচালিত সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনে প্রস্তুতকৃত এবং কম্পিউটার দ্বারা মান নিয়ন্ত্রিত পোল্ট্রি ফিড।
- ❑ বিশেষজ্ঞ পুষ্টি বিদের ফর্মুলা অনুযায়ী ক্রামচিক এক্সেল লেয়ার ফিডে ক্যালরী, প্রোটিন, চর্বি, আঁশ, লবন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন, প্রিমিক্স, মিনারেল ইত্যাদি সঠিক পরিমাণে বিদ্যমান।
- ❑ ক্রামচিক এক্সেল লেয়ার ফিড মাইকোটক্সিন ও প্যাথজেনিক ছত্রাক থেকে মুক্ত।
- ❑ ক্রামচিক এক্সেল লেয়ার ফিড উন্নতমানের পি পি ওভেন ব্যাগ এ সরবরাহ করা হয়, যা ফিড এর গুণগত মান বজায় রাখে।
- ❑ মোরগ মুরগীর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা, লেয়ারের সর্বোচ্চ ডিম উৎপাদন ক্ষমতা ও ডিমের ওজন বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি মৃত্যুহার কমাতে ক্রামচিক এক্সেল লেয়ার ফিডে বিভিন্ন প্রকার টনিক, ভিটামিন, ও ফিড এডিটিভসমূহ মেশানো হয়।
- ❑ ক্রামচিক এক্সেল লেয়ার ফিড সকল ব্রিডের জন্য উপযোগী।

এক্সেল লেয়ার ফিডের পুষ্টিমান:

নিউট্রিশন/পুষ্টি	লেয়ার স্টার	লেয়ার প্রোয়ার	লেয়ার লেয়ার
ময়দার(সর্বোচ্চ)	১১	১১	১১
ক্রুড প্রোটিন (সর্বনিম্ন)	২২	১৮.৫	১৯
ক্রুড ফাইবার (সর্বোচ্চ)	৫.০	৫.৫	৫.৫
ক্রুড ফ্যাট (সর্বনিম্ন)	৩.০	৩.৫	৩.৫
লাইসিন (সর্বনিম্ন)	১.২	০.৯	০.৮
মিথিওনিন (সর্বনিম্ন)	০.৫	০.৪	০.৪
মিথিওনিন+সিসটিন	০.৯	০.৮	০.৯
টিরোনিন (সর্বনিম্ন)	০.৮	০.৬৫	০.৮
টেপটোফ্যান (সর্বনিম্ন)	০.২	০.১৭	০.১৯
আরজিনাইন	১.৩	১.২	১.২
ক্যালসিয়াম (সর্বনিম্ন)	০.৯	১.০	৩.৮
এড্‌ইলএবেল পি (সর্বনিম্ন)	০.৪৫	০.৪	০.৪
এনার্জি (সর্বনিম্ন)	২৯২৫	২৯০০	২৮৫০

ক্রামচিক এক্সেল লেয়ার ফিড এর খাদ্য সূচী:

ক্রামচিক লেয়ার স্টার (ক্রাম্বোল)	১-৮ সপ্তাহ
ক্রামচিক লেয়ার প্রোয়ার (ম্যাশ)	৯-১৭ সপ্তাহ
ক্রামচিক লেয়ার লেয়ার (ম্যাশ)	১৮ সপ্তাহ-বিক্রয় পর্যন্ত
ক্রামচিক লেয়ার প্রোয়ার (ক্রাম্বোল)	৯-১৭ সপ্তাহ
ক্রামচিক লেয়ার লেয়ার (ক্রাম্বোল)	১৮ সপ্তাহ-বিক্রয় পর্যন্ত

লেয়ার মুরগীর বয়স, দৈহিক ওজন ও উৎপাদন অনুযায়ী খাদ্য প্রদান (আদর্শ অবস্থায়) :

বয়স (সপ্তাহ)	গড় দৈহিক ওজন (গ্রাম)	মুরগী প্রতি খাদ্য প্রদান (গ্রাম)	ডিম উৎপাদন %
১	৬১-৬৯	১৪-১৫	০
২	১১২-১১৮	১৪-১৮	০
৩	১৭৬-১৮৫	১৮-২০	০
৪	২৪৫-২৫৫	২৯-৩১	০
৫	৩২৪-৩৩৬	৩৮-৪০	০
৬	৪১৩-৪২৭	৪১-৪২	০
৭	৫০২-৫১৮	৪৩-৪৪	০
৮	৫৯১-৬০৯	৪৫-৪৭	০
৯	৬৮০-৮৯২	৪৬-৫০	০
১০	৯৪৭-৯৭৩	৪৯-৫৩	০
১১	১০১৬-১০৪৪	৫১-৫৬	০
১২	১০৮৫-১১১৫	৫৪-৫৮	০
১৩	১১৫৪-১১৮৬	৫৫-৫৯	০
১৪	১১৯৩-১২২৭	৫৭-৬১	০
১৫	১২৩২-১২৬৮	৫৯-৬৩	০
১৬	১১৯৩-১২২৭	৬০-৬৩	০
১৭	১২৩২-১২৬৮	৬০-৬৪	০
১৮	১২৬০-১৩০০	৭০-৭৬	২
১৯	১৩২০-১৩৬০	৭৩-৭৯	১৫-২২
২০	১৩৬০-১৪০০	৭৬-৮২	৩৫-৫০
২১	১৪১০-১৪৫০	৭৭-৮৩	৬২-৭৫
২২	১৪৪০-১৪৮০	৮০-৮৬	৮২-৮৮
২৩	১৪৫০-১৪৯০	৮৪-৯০	৯০-৯২
২৪	১৪৬০-১৫০০	৮৭-৯৩	৯৩-৯৪

ঈশা ব্রাউন জাত

বয়স (সপ্তাহ)	গড় দৈহিক ওজন (গ্রাম)	মুরগী প্রতি খাদ্য প্রদান (গ্রাম)	ডিম উৎপাদন %
১	৬৫	১০	০
২	১২০	১৭	০
৩	২০০-২১৫	২৫	০
৪	২৮৫-৩০০	৩১	০
৫	৩৭৫-৪০০	৩৭	০
৬	৪৭০-৫০০	৪৩	০
৭	৫৫৫-৬০০	৪৯	০
৮	৬৫০-৬৯০	৫৩	০
৯	৭৩৫-৭৮০	৫৭	০
১০	৮৩০-৮৭৫	৬১	০
১১	৯১০-৯৬০	৬৫	০
১২	১০১০-১০৫০	৬৯	০
১৩	১১০০-১১৪০	৭৩	০
১৪	১১৮৫-১২৩০	৭৬	০
১৫	১২৭০-১৩২০	৭৯	০
১৬	১৩৫৫-১৪১০	৮১	০
১৭	১৪৪০-১৫০০	৮৪	০
১৮	১৫৩০	৮৬	২
১৯	১৫৮০	৯০	১৬
২০	১৬৪০	৯৬	৩৮
২১	১৭০৫	১০৬	৬৪
২২	১৭৫৫	১১০	৮৪
২৩	১৭৯০	১১২	৯১
২৪	১৮০৫	১১২	৯৩

* মুরগীর জাত এবং ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ কম বা বেশী হতে পারে।

সেড নির্মান:

- ✱ মুরগীর ঘর অবশ্যই পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা লম্বি ভাবে তৈরী করতে হবে এবং অবাধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ✱ সেডের প্রস্থ সর্বোচ্চ ২৫ ফুট এবং দৈর্ঘ্য খামারীর চাহিদা অনুযায়ী করা যাবে।
- ✱ দেয়ালের উচ্চতা ৯ফুট এবং ঘরের চালের বর্ধিত অংশ হবে ৩ ফুট।

ঘর প্রস্তুত করন :

হুয়াইট ওয়াশঃ চুন-২৫ কেজি, ব্লিচিং-১ কেজি, তুতে-৬০০ গ্রাম, কেরোসিন-১ লিটার এক সাথে মিশিয়ে মেঝেতে প্রলেপ দিতে হবে।

- ✱ সমস্ত ময়লা এবং লিটার খুব দ্রুত পরিষ্কার করতে হবে।
- ✱ মুরগীর শেডের পর্দা, সিলিং, নেট, দরজা, খাবারপাত্র, পানির পাত্র, হোভার, চিক গার্ডসহ প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে।
- ✱ মুরগীর শেডের প্রতিটি কর্ণার এবং মেঝে ভালোভাবে ঘসতে হবে।
- ✱ প্রতি ১০০০ বর্গফুটের জন্য ২.৫ কেজি কস্টিক সোডার গুড়া পানির সাথে মিশিয়ে মেঝেতে কিছুক্ষন রাখতে হবে।
- ✱ ব্রডস্প্রেট্রাম জীবানুনাশক দ্বারা শেডের প্রত্যেকটি সাইড এবং প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র (পর্দা, সিলিং, নেট, দরজা, খাবারপাত্র, পানির পাত্র, হোভার, চিকগার্ড) ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

জায়গার পরিমান:

০-৮ সপ্তাহ ০.৫ বর্গফুট/বাচ্চা
৯-১৫ সপ্তাহ ১.৫ বর্গফুট/পুলেট
১৬ সপ্তাহ তদুর্দ্ধে ২ বর্গফুট
খাচায় বাচ্চা পালনের ক্ষেত্রে ৩ টি মুরগীর জন্য-
খাচার দৈর্ঘ্য ১৮ইঞ্চি, প্রস্থ ১৩ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ১৭ ইঞ্চি হতে হবে।

লিটার ব্যবস্থাপনা-

- ✱ লিটারের উচ্চতা ৪-৫ ইঞ্চি এবং লিটার শুকনো রাখতে হবে।
- ✱ লিটার ভেজা থাকলে প্রতি ১,০০০ বর্গফুট জায়গার জন্য ২-৪ কেজি শুকনা চুন ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ✱ প্রতি দিন পা দিয়ে লিটার উল্টিয়ে দিতে হবে।

লেয়ার মুরগীর লাইটিং প্রোগ্রাম:

গ্রীষ্মকাল ঃ	
দিন/সপ্তাহ	ঘন্টা
০-৩ দিন	২৪ ঘন্টা
৩-৭ দিন	২৩ ঘন্টা
২য় সপ্তাহ	২২ ঘন্টা
৩য় সপ্তাহ	২১ ঘন্টা
৪র্থ সপ্তাহ	২০ ঘন্টা
৫ম সপ্তাহ	১৮ ঘন্টা
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	১৬ ঘন্টা
৭ম সপ্তাহ	১৪ ঘন্টা
৮-১৮ম সপ্তাহ	প্রাকৃতিক আলো

বিঃ দ্রঃ লাইটিং এর দৈর্ঘ্য মুরগীর ওজনের উপর নির্ভর করে কম বা বেশী হতে পারে।

ঠোট কাটার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে-

- ১। অসুস্থ ও দুর্বল বাচ্চার ঠোট কাটা যাবে না।
- ২। ঠোট কাটার সময় তাড়াহুড়া করা যাবে না।
- ৩। প্রশিক্ষন প্রাপ্তও দক্ষ ব্যক্তিকে দিয়ে ঠোট কাটানো উচিত।
- ৪। খাবার পানিতে এই সময় ভিটামিন "K" ও ইলেকট্রোলাইটস ব্যবহার করতে হবে।